



<p>Name des Patienten:</p> <p>Name des Arztes:</p> <p>Tel.-Nr. des Arztes:</p> <p>Tragen Sie diese Karte bitte für vier Monate nach der letzten Anwendung von Flixabi ständig bei sich oder, im Fall einer Schwangerschaft, für 12 Monate nach Geburt Ihres Kindes. Nebenwirkungen können auch noch längere Zeit nach der letzten Anwendung auftreten.</p>	<p>Beginn der Therapie mit Flixabi:</p> <p>Laufende Behandlungen:</p> <p>Bitte bringen Sie zu jedem Arztbesuch unbedingt eine vollständige Liste aller von Ihnen angewendeten Medikamente mit.</p>	<p>Liste anderer Medikamente:</p> <p>Liste der Allergien:</p>	<p>Bitte Sie Ihren Arzt, die Art und das Datum der letzten Untersuchung(en) auf Tuberkulose (Tbc) unten zu dokumentieren:</p> <p>Test: _____</p> <p>Datum: _____</p> <p>Ergebnis: _____</p>	<p>RMA version 11/2022</p> <p>Patientenkarte</p> <p>Flixabi™ 100 mg Infliximab</p> <p>DE</p> <p>Zeigen Sie diese Karte jedem Arzt, bei dem Sie in Behandlung sind.</p> <p>SAMSUNG BIOEPIS</p>	<p>Nom du patient :</p> <p>Nom du médecin :</p> <p>Numéro de téléphone du médecin :</p> <p>Gardez cette carte sur vous pendant 4 mois après votre dernière dose de Flixabi, ou en cas de grossesse pendant 12 mois après la naissance de votre bébé. Les effets indésirables peuvent survenir longtemps après votre dernière dose.</p>	<p>Date d'instauration du traitement par Flixabi :</p> <p>Administrations actuelles :</p> <p>Assurez-vous d'avoir également avec vous une liste de tous les autres médicaments que vous utilisez lors de chaque visite auprès d'un professionnel de santé.</p>	<p>Liste des autres médicaments :</p> <p>Liste des allergies :</p>	<p>Demandez à votre médecin de noter le type et la date du (des) dernier(s) test(s) de dépistage de la tuberculose ci-dessous :</p> <p>Test : _____</p> <p>Date : _____</p> <p>Résultat : _____</p>	<p>RMA version 11/2022</p> <p>Carte de rappel patient</p> <p>Flixabi™ 100 mg infiximab</p> <p>FR</p> <p>Montrez cette carte à tous les médecins impliqués dans votre traitement.</p> <p>SAMSUNG BIOEPIS</p>	<p>Naam patiënt:</p> <p>Naam arts:</p> <p>Telefoonnummer arts:</p> <p>Bewaar deze kaart nog 4 maanden na uw laatste dosis Flixabi, of in geval van zwangerschap 12 maanden na de geboorte van uw baby. Er kunnen bijwerkingen optreden tot lang na uw laatste dosis.</p>	<p>Aanvangsdatum Flixabi-behandeling:</p> <p>Huidige toedieningen:</p> <p>Zorg ervoor dat u bij elk bezoek aan een zorgverlener ook een lijst meebrengt van alle andere medicijnen die u gebruikt.</p>	<p>Lijst van andere geneesmiddelen:</p> <p>Lijst van allergieën:</p>	<p>Vraag uw arts het type en de datum van de laatste tuberculose (tbc)-controle(s) hieronder te noteren:</p> <p>Onderzoek: _____</p> <p>Datum: _____</p> <p>Uitslag: _____</p>	<p>SAMSUNG BIOEPIS</p> <p>53426-07</p> 	<p>RMA version 11/2022</p> <p>Patiëntherinne ringskaart</p> <p>Flixabi™ 100 mg infiximab</p> <p>NL</p> <p>Toon deze kaart aan alle artsen die bij uw behandeling betrokken zijn.</p>
--	--	---	---	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	---

FRONT PAGE



<p>Deze patiëntenherinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voor en tijdens de behandeling met Flixabi.</p> <p>Lees de bijsluiter van Flixabi zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.</p> <p>Het is belangrijk dat u en uw arts de merknaam en het partijnummer van uw geneesmiddelen noteren.</p>	<p>Infecties Vóór de behandeling met Flixabi</p> <ul style="list-style-type: none"> Licht uw arts in als u een infectie heeft, ook als het er een van zeer geringe ernst is. Het is zeer belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit tbc heeft gehad, en of u in contact bent gekomen met iemand die tbc had. Uw arts zal u onderzoeken om vast te stellen of u tbc heeft. Vraag uw arts het type en de datum van uw laatste tbc-controle(s) op de kaart te noteren. 	<ul style="list-style-type: none"> Licht uw arts in als u hepatitis B heeft, of als u weet of vermoedt een drager van het hepatitis B-virus te zijn. <p>Tijdens de behandeling met Flixabi</p> <ul style="list-style-type: none"> Licht uw arts onmiddellijk in als u tekenen van infectie vertoont. Zulke tekenen kunnen zijn: koorts, vermoeidheid, (hardnekkig) hoesten, kortademigheid, gewichtsverlies, nachtelijk transpireren, diarree, wonden, tandpijn, een brandend gevoel bij het 	<p>urineren of 'griepachtige' verschijnselen.</p>	<p>Zwangerschap, borstvoeding en vaccinaties</p> <ul style="list-style-type: none"> Als u Flixabi heeft gekregen terwijl u zwanger was of als u borstvoeding geeft, is het belangrijk dat u dit aan de arts van uw baby vertelt voordat u baby een vaccin krijgt. Uw baby mag binnen 12 maanden na de geboorte of als u borstvoeding geeft geen 'levend vaccin' krijgen, zoals BCG (gebruikt om tuberculose te voorkomen) behalve als de arts van uw baby anders aanbeveelt. 		<p>Cette carte de rappel patient contient des informations importantes de sécurité que vous devez connaître avant et pendant votre traitement par Flixabi.</p> <p>Veuillez lire attentivement la « Notice » de Flixabi avant de commencer à utiliser ce médicament.</p> <p>Il est important que vous et votre médecin consigniez le nom de marque et le numéro de lot de votre médicament.</p>	<p>Infections Avant le traitement par Flixabi</p> <ul style="list-style-type: none"> Veillez informer votre médecin si vous présentez une infection, même si elle est très légère. Il est très important d'informer votre médecin si vous avez déjà présenté une tuberculose ou si vous avez été en contact avec une personne ayant déjà présenté une tuberculose. Votre médecin vous prescrira des tests pour voir si vous avez la tuberculose. Demandez à 	<p>votre médecin de noter le type et la date de votre (vos) dernier(s) test(s) de dépistage de la tuberculose sur la carte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Veillez informer votre médecin si vous souffrez de l'hépatite B ou si vous savez ou suspectez que vous êtes porteur du virus de l'hépatite B. <p>Pendant le traitement par Flixabi</p> <ul style="list-style-type: none"> Veillez informer votre médecin immédiatement si vous présentez les signes d'une infection. Les signes incluent de la fièvre, une 	<p>sensation de fatigue, une toux (persistante), un essoufflement, une perte de poids, des sueurs nocturnes, une diarrhée, des plaies, des problèmes dentaires, des brûlures à la miction ou des symptômes « pseudo-grippaux ».</p>	<p>Grossesse, allaitement et vaccinations</p> <ul style="list-style-type: none"> Si vous avez reçu Flixabi pendant votre grossesse ou si vous allaitez, il est important d'en informer votre pédiatre avant que votre bébé ne reçoive un vaccin. Votre bébé ne doit pas recevoir de « vaccin vivant », comme le BCG (utilisé pour prévenir de la tuberculose) dans les 12 mois suivant la naissance ou pendant que vous allaitez, sauf avis contraire de votre pédiatre. 		<p>Diese Patientenkarte enthält wichtige Sicherheitsinformationen, die Sie vor und während der Behandlung mit Flixabi kennen müssen.</p> <p>Bitte lesen Sie die Packungsbeilage für Flixabi sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.</p> <p>Es ist wichtig, dass Sie und Ihr Arzt den Arzneimittelnamen und die Chargenbezeichnung schriftlich festhalten.</p>	<p>Infektionen Vor der Behandlung mit Flixabi</p> <ul style="list-style-type: none"> Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie eine Infektion haben, auch wenn es eine sehr leichte ist. Es ist sehr wichtig, dass Sie es Ihrem Arzt mitteilen, wenn Sie jemals eine Tuberkulose hatten oder wenn Sie in engem Kontakt mit jemandem standen, der eine Tuberkulose hatte. Ihr Arzt wird testen, ob Sie Tuberkulose haben. Bitten Sie Ihren Arzt, die Art und das Datum der letzten 	<p>Untersuchung(en) auf Tuberkulose auf der Karte zu dokumentieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> Teilen Sie Ihrem Arzt mit, wenn Sie Hepatitis B haben, oder wissen oder vermuten, dass Sie Träger des Hepatitis-B-Virus sind. <p>Während der Behandlung mit Flixabi</p> <ul style="list-style-type: none"> Teilen Sie Ihrem Arzt sofort mit, wenn bei Ihnen Anzeichen einer Infektion auftreten. Anzeichen können Fieber, Gefühl von Müdigkeit, (anhaltender) Husten, Kurzatmigkeit, Gewichtsverlust, 	<p>nächtliches Schwitzen, Durchfall, Wunden, Zahnprobleme, ein brennendes Gefühl beim Wasser lassen oder „grippeähnliche“ Zeichen sein.</p>	<p>Schwangerschaft, Stillzeit und Impfungen</p> <ul style="list-style-type: none"> Falls Sie Flixabi während der Schwangerschaft erhalten haben oder falls Sie stillen, ist es wichtig, den Arzt Ihres Kindes darüber zu informieren, bevor Ihr Kind irgendeine Impfung erhält. Ihr Kind sollte in den ersten 12 Lebensmonaten oder während Sie Ihr Kind stillen keine sogenannten Lebendimpfstoffe, wie z. B. BCG (wird zum Schutz gegen Tuberkulose verwendet), erhalten, außer auf Empfehlung des Arztes Ihres Kindes. 	
--	---	---	---	--	--	--	---	--	---	--	--	--	---	---	---	---	--

BACK PAGE