

etanercept

KARTA PACIENTA

Jméno pacienta

Jméno lékaře

Telefon lékaře

HLÁŠENÍ NEŽÁDOUCÍCH ÚČINKŮ:

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete na:
<http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek>.

Adresa pro zaslání:
Státní ústav pro kontrolu léčiv, Odbor farmakovigilance,
Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, email: farmakovigilance@sukl.cz.

Karta pacienta
rozměr po složení – 74 × 105 mm

Tato karta obsahuje důležité informace o bezpečnosti, které potřebujete vědět dříve, než poprvé dostanete přípravek s léčivou látkou etanercept a po celou dobu jeho aplikace. Pokud Vám cokoli z níže uvedených informací nebude jasné, prosím, požádejte svého lékaře o vysvětlení.

- ▶ Ukažte tuto kartu každému lékaři, který se podílí na Vaší léčbě.
- ▶ Vždy si přečtěte také Příbalovou informaci pro pacienty, která obsahuje další důležité informace.
- ▶ Ponechte si tuto kartu ještě po dobu 2 měsíců od podání poslední dávky přípravku, protože nežádoucí účinky se mohou vyskytnout i po podání poslední dávky.

Je důležité, abyste si Vy i Váš lékař poznamenali obchodní název a číslo šarže každého nového balení přípravku.

INFEKCE

Léčivá látka etanercept může zvýšit riziko vzniku infekcí, které mohou být závažné.

- ▶ Pokud máte infekční onemocnění, neužívejte přípravek. Nejste-li si jistý/á, zeptejte se svého lékaře.
- ▶ Pokud se u Vás objeví příznaky svědčící o infekci jako jsou horečka, přetrvávající kašel, úbytek na váze nebo apatie (zvýšená únavnost, lhostejnost), okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- ▶ Měl/a byste být vyšetřen/a na tuberkulózu (TB). Požádejte svého lékaře, aby zapsal data a výsledky Vašeho posledního screeningového vyšetření na tuberkulózu do níže uvedených položek:

Test Datum

Výsledek

Test Datum

Výsledek

- ▶ Prosím, požádejte svého praktického lékaře, aby níže uvedl seznam všech Vašich léků, které mohou zvyšovat riziko infekce.

.....

.....

.....

.....

.....

MĚSTNAVÉ SRDEČNÍ SELHÁNÍ

- ▶ Pokud se u Vás rozvinou příznaky městnavého srdečního selhání nebo zhoršení stávajícího srdečního selhávání jako jsou dušnost, otok kotníků, přetrvávající kašel nebo únava, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.