















PROFILE NAME		PRODUCT(S)		PATTERNS AND COLORS	
PATIENT REMINDER CARD_3 LANG_SB2_V01_P3		SB2		 VARNISH FREE	 PROFILE
DIMENSION mm		DATE MODIFIED		 TEXT FREE	 TEXT LIMIT
797,5x75 - Folded: 45x75		28 MAY 2019		 PERFORATION	 PROFILE (Non Print)
SUPPLIER DIE LINE		PREPARED BY:		 BRAILLE GRID	 Technical (Non Print)
TDPAC3LSB2_0518_V02		SCHAWKI			


* this component is varnished except on the varnish-free areas

ITEM NUMBER	DESCRIPTION	PRIMARY FONT USED	ARTWORK COLORS
53535-06	COM PATIENT REMINDER CARD FLIXABI DNK/NOR	Calibri, Calibri-Bold	    
	LANGUAGE(S)	TEMPLATE NUMBER	MIN FONT SIZE (BODY TEXT)
	Danish, Norwegian	PKG020351-01	8,0 pt
PROOF NUMBER	PHARMA CODE	PHARMA CODE TYPE	VERSION CODE
02	10206	Standard	N/A
	GS REFERENCE	DATE MODIFIED	
	Schawk-107457174/402946519 0130	17 Aug 2022	
	BARCODE NUMBER	CMO ITEM NUMBER	APPROVED BY
	N/A	N/A	




biogen



						Patientens navn: _____ Lægens navn: _____ Lægens telefonnummer: _____ Opbevar dette kort på dig i 4 måneder, når du har fået din sidste dosis Flixabi, eller i tilfælde af graviditet i 12 måneder, efter du har født. Bivirkninger kan forekomme lang tid efter sidste dosis.	Dato for start af Flixabi-behandling: _____ Nuværende administrationer: _____ Du skal sikre dig, at du ved hvert lægebesøg også medbringer en liste over alle andre lægemidler, som du bruger.	Liste over anden medicin _____ _____ _____ Liste over allergier _____ _____ _____	Du skal bede din læge om at notere type og dato for seneste screening(er) for tuberkulose (TB) nedenfor: Test: _____ Dato: _____ Resultat: _____	Patientinformationskort Flixabi™ 100 mg influximab DA Vis dette kort til enhver læge, der er involveret i din behandling.	Pasientnavn: _____ Legens navn: _____ Legens telefonnummer: _____ Ha dette kortet med deg i fire måneder etter din siste dose med Flixabi, eller ved graviditet, i minst 12 måneder etter fødselen av barnet ditt. Bivirkninger kan oppstå i lang tid etter din siste dose.	Dato for oppstart av Flixabi-behandling: _____ Nåværende administrering: _____ Lag deg også en liste over alle andre legemidler som du bruker og ta denne med til ethvert besøk hos lege.	Liste over andre legemidler: _____ _____ _____ Liste over allergier: _____ _____ _____	Be legen din notere type og dato for den/de siste undersøkelse(n) for tuberkulose (TB) under: Test: _____ Dato: _____ Resultat: _____	SAMSUNG BIOEPIS 53535-06 	Pasientkort Flixabi™ 100 mg influximab NO Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i din behandling.
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--

FRONT PAGE



<p>Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Flixabi.</p> <p>Vennligst les pakkingsvedlegget til Flixabi nøye før du starter å bruke dette legemidlet.</p> <p>Det er viktig at du og legen din noterer ned handelsnavnet og produktionsnummeret til legemidlene dine.</p>	<p>Infeksjoner</p> <p>Før Flixabi-behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informer legen din dersom du har en infeksjon, selv om den er mindre alvorlig. • Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt TB, eller hvis du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste undersøkelse(r) for TB på kortet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Informer legen din dersom du har hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset. <p>Under Flixabi-behandling</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svis ved vannlating eller influensalignende symptomer. 	<p>Graviditet, amning og vaksiner</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du fikk Flixabi da du var gravid eller hvis du ammer, er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en "levende vaksine", slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose), før 12 måneder etter fødselen eller så lenge du ammer, med mindre ditt barns lege anbefaler noe annet. 			<p>Dette pasientinformasjonskortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon, som du skal være oppmerksom på før og under behandling med Flixabi.</p> <p>Læs indlægssedlen for Flixabi grundigt, inden du begynder at tage medicinen.</p> <p>Det er vigtigt, at du og din læge noterer produktnavn og lotnummer på din medicin.</p>	<p>Infektioner</p> <p>Før behandling med Flixabi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortæl din læge, hvis du har en infektion, også selvom det er en meget let infektion. • Det er meget vigtigt, at du fortæller din læge, hvis du nogensinde har haft TB, eller hvis du har været i tæt kontakt med en person, som har haft TB. Din læge vil teste dig for at se, om du har haft TB. Du skal bede din læge om at notere type 	<p>og dato for din(e) seneste screening(er) for TB på kortet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortæl din læge, hvis du har hepatitis B, eller hvis du ved eller har mistanke om, at du er bærer af hepatitis B-virus. <p>Under behandling med Flixabi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortæl straks din læge, hvis du har tegn på en infektion. Tegn inkluderer feber, træthedsfølelse, (vedvarende) hoste, åndenød, vægttab, natlig svedtendens, diarré, sår, 	<p>tandproblemer, en brændende smerte, når du lader vandet, eller influenzalignende symptomer.</p>	<p>Graviditet, amning og vaccinationer</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hvis du har fået Flixabi, mens du var gravid, eller hvis du ammer, er det vigtigt, at du informerer dit barns læge om det, før dit barn bliver vaccineret. Dit barn må ikke få en "levende vaccine", fx BCG (bruges til at forebygge tuberkulose), inden for 12 måneder efter fødslen, eller mens du ammer, medmindre barnets læge anbefaler noget andet. 							
--	---	--	--	--	--	---	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--

BACK PAGE