

Patsiendi kaart
Benepali
etanertsept

Sellel kaardil on ära toodud oluline ohutusala teave, millest peate olema teadlik enne Benepaliga ravi alustamist ja selle jooksul. Kui teile jääb midagi arusaamatuks, paluge oma arstil seda teile selgitada.

- Näidake seda kaarti kõigile teid või teie last ravivatele arstidele.

Infektsioonid

Benepali võib suurendada raskete infektsioonide tekkeriski.

- Kui teil on infektsioon, ei tohi te Benepali kasutada. Kui te ei ole milleski kindel, pidage nõu oma arstiga.
- Kui teil tekivad infektsioonile viitavad sümptomid nagu palavik, püsiv köha, kaalulangus või loidus, pöörduge kohe arsti poole.
- Teid tuleb hinnata tuberkuloosi suhtes. Paluge oma arstil märkida viimase tuberkuloosiuuringu kuupäev ja tulemused järgmistele väljadele.

Analüüs: _____ Analüüs: _____
Kuupäev: _____ Kuupäev: _____
Tulemus: _____ Tulemus: _____

- Paluge oma arstil loetleda muud ravimid, mis võivad suurendada infektsiooni tekkeriski.

Südame paispuudulikkus

- Kui teil on südame paispuudulikkus ja te arvate, et selle sümptomid (nt hingeldus või jalgade turse) süvenevad või kui teil tekivad need sümptomid uuesti, pöörduge kohe arsti poole.

Muu teave (palun täitke)

Patsiendi nimi: _____

Arsti nimi: _____

Arsti telefon: _____

- Kandke seda kaarti endaga kaasas kuni 2 kuud pärast Benepali viimast annust, kuna kõrvaltoimed võivad ilmneda ka pärast Benepali viimase annuse saamist.