

Ime bolesnika:

Ime liječnika:

Telefonski broj liječnika:

Datum početka liječenja
lijekom Flixabi:

Sadašnji režim primjene lijeka:

Prilikom svakog posjeta
liječniku obavezno ponesite
popis svih drugih lijekova
koje uzimate.

Popis drugih lijekova:

Popis alergija:

Zamolite liječnika da ovdje
zabilježi vrstu i datum
posljednjeg testiranja na
tuberkulozu (TBC):

Test:

Datum:

Rezultat:

Kartica s podsjetnikom
za bolesnika

 **Flixabi™** 100 mg
infliksimumab

HR

Pokažite ovu karticu
svakom liječniku koji
sudjeluje u Vašem liječenju.

SAMSUNG BIOEPIS

Nosite ovu karticu sa sobom
još 4 mjeseca nakon
posljednje doze lijeka
Flixabi ili, u slučaju trudnoće,
još 12 mjeseci nakon poroda.
Nuspojave se mogu javiti
dugo vremena nakon zadnje
doze lijeka.

Ova kartica s podsjetnikom za bolesnika sadrži važne sigurnosne informacije, kojih morate biti svjesni prije i tijekom liječenja lijekom Flixabi.

Pažljivo pročitajte uputu o lijeku za lijek Flixabi prije nego što počnete primati ovaj lijek.

Važno je da Vi i Vaš liječnik zabilježite zaštićeni naziv i broj serije Vašeg lijeka.

Infekcije

Prije liječenja lijekom Flixabi

- Obavijestite liječnika ako imate neku infekciju, čak i ako je vrlo blaga.
- Vrlo je važno da obavijestite liječnika ako ste ikada bolovali od tuberkuloze (TBC-a) ili bili u bliskom kontaktu s osobom koja je bolovala od tuberkuloze. Liječnik će Vas testirati da utvrdi imate li tuberkulozu. Zamolite liječnika da na ovu karticu upiše vrstu i datum zadnjeg testiranja na TBC.

- Obavijestite liječnika ako imate hepatitis B ili ako znate ili sumnjate da ste zaraženi virusom hepatitisa B.

Tijekom liječenja lijekom Flixabi

- Odmah obavijestite liječnika ako se pojave znakovi infekcije. Ti znakovi uključuju vrućicu, umor, (ustrajan) kašalj, nedostatak zraka, gubitak tjelesne težine, noćno znojenje, proljev, rane, probleme sa zubima, žarenje pri mokrenju ili simptome nalik gripi.

Trudnoća, dojenje i cijepljenje

- U slučaju da ste primali Flixabi za vrijeme trudnoće ili ako dojite, važno je da o tome obavijestite pedijatra svog djeteta prije nego što Vaše dijete primi ikakvo cjepivo. Vaše dijete ne smije primiti "živo cjepivo", kao što je BCG (primjenjuje se za sprječavanje tuberkuloze), unutar 12 mjeseci od rođenja ili dok ga dojite, osim ako djetetov pedijatar preporuči drugačije.