

Flixabi 100 mg

infliximab

Patiëntenherinneringskaart

Naam patiënt:

Naam arts:

Telefoonnummer arts:

Deze patiëntenherinneringskaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie waarvan u op de hoogte moet zijn voor en tijdens de behandeling met Flixabi.

Toon deze kaart aan alle artsen die bij uw behandeling betrokken zijn.

Lees de bijsluiter van Flixabi zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.

Aanvangsdatum Flixabi-behandeling:

Huidige toedieningen:

Het is belangrijk dat u en uw arts de merknaam en het partijnummer van uw geneesmiddelen noteren.

Vraag uw arts het type en de datum van de laatste tuberculose (tbc)-controle(s) hieronder te noteren:

Onderzoek:

Datum:

Uitslag:

Zorg ervoor dat u bij elk bezoek aan een zorgverlener ook een lijst meebrengt van alle andere medicijnen die u gebruikt.

Lijst van allergieën:

Lijst van andere geneesmiddelen:

Infecties

Vóór de behandeling met Flixabi

- Licht uw arts in als u een infectie heeft, ook als het er een van zeer geringe ernst is.
- Het is zeer belangrijk dat u uw arts vertelt of u ooit tbc heeft gehad, en of u in contact bent gekomen met iemand die tbc had. Uw arts zal u onderzoeken om vast te stellen of u tbc heeft. Vraag uw arts het type en de datum van uw laatste tbc-controle(s) op de kaart te noteren.
- Licht uw arts in als u hepatitis B heeft, of als u weet of vermoedt een drager van het hepatitis B-virus te zijn.

Tijdens de behandeling met Flixabi

- Licht uw arts onmiddellijk in als u tekenen van infectie vertoont. Zulke tekenen kunnen zijn: koorts, vermoeidheid, (hardnekkig) hoesten, kortademigheid, gewichtsverlies, nachtelijk transpireren, diarree, wonden, tandpijn, een brandend gevoel bij het urineren of 'griepachtige' verschijnselen.

Zwangerschap en vaccinaties

- Als u Flixabi heeft gekregen terwijl u zwanger was, is het belangrijk dat u dit aan de arts van uw baby vertelt voordat uw baby een vaccin krijgt. Uw baby mag binnen 6 maanden na de geboorte geen 'levend vaccin' krijgen, zoals BCG (gebruikt om tuberculose te voorkomen)

Bewaar deze kaart nog vier maanden na uw dosis Flixabi, of in geval van zwangerschap ten minste 6 maanden na de geboorte van uw baby. Er kunnen bijwerkingen optreden tot lang na uw laatste dosis.